



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR TAMPAKAN (SOUTH COTABATO)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSAS	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	23.76	1.25	Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	23.13	1.00	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	23.66	0.88	Cloudy	No Rain	0			
Sat	20-Jan-24	24.36	1.14	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	24.36	0.81	Cloudy	No Rain	0			
Mon	22-Jan-24	23.44	4.60	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing,
Tue	23-Jan-24	23.30	1.66	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	24.21	1.55	Cloudy	No Rain	0			
Thu	25-Jan-24	23.19	1.35	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	26-Jan-24	23.31	1.36	Cloudy	Light Rains	<60			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses
- Cloudy with No to Light Rains.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulanang at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR SANTO NINO (SOUTH COTABATO)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSAS	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	24.95	0.62	Mostly Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.42	0.32	Cloudy	Moderate Rains	60-180			
Fri	19-Jan-24	24.73	0.90	Cloudy	Light Rains	<60	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sat	20-Jan-24	24.95	0.40	Cloudy	Light Rains	<60			
Sun	21-Jan-24	25.77	0.43	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing
Mon	22-Jan-24	23.28	4.89	Cloudy	No Rain	0			
Tue	23-Jan-24	23.15	0.96	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	23.53	0.93	Cloudy	No Rain	0			
Thu	25-Jan-24	22.69	1.23	Mostly Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	26-Jan-24	23.11	1.06	Cloudy	No Rain	0			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibling contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
 MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
 Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
 Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
 Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



Building Climate-Resilient Livelihoods and Agrifisheries Communities

## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR President Roxas (North Cotabato)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	25.49	1.79	Mostly Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.27	1.64	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	25.08	0.85	Cloudy	No Rain	0			
Sat	20-Jan-24	25.93	1.42	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	26.37	1.62	Cloudy	No Rain	0			
Mon	22-Jan-24	26.42	4.33	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	26.20	1.58	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	26.23	1.75	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Thu	25-Jan-24	25.56	1.92	Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	25.99	1.21	Cloudy	Light Rains	<60			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulanang magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibling contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

### Pigkawayan (North Cotabato)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	26.58	1.55	Mostly Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	26.37	1.12	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	26.92	1.30	Cloudy	No Rain	0			
Sat	20-Jan-24	26.94	1.27	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	27.44	1.41	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	22-Jan-24	26.07	6.10	Mostly Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	25.57	1.42	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	25.68	1.23	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Thu	25-Jan-24	25.04	1.20	Mostly Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	25.20	1.33	Cloudy	No Rain	0			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA  
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

## IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

## CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulanan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

## DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

## MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR MALAPATAN (SARANGANI)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	24.90	2.76	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.38	2.02	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	23.18	2.08	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	20-Jan-24	25.06	2.38	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	25.26	1.89	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	22-Jan-24	23.48	8.62	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	23.61	1.66	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	23.67	1.71	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Thu	25-Jan-24	23.92	1.48	Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	23.07	1.79	Cloudy	Light Rains	<60			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Cloudy with No to Light Rains.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR Maasim (Sarangani)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	25.70	3.38	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.90	2.15	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	24.12	2.00	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	20-Jan-24	25.46	3.13	Cloudy	Light Rains	<60	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	25.82	1.98	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	22-Jan-24	24.62	8.10	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	24.99	2.37	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	24.95	2.12	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Thu	25-Jan-24	24.68	1.88	Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	24.58	2.81	Cloudy	No Rain	0			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. *Source of basic information* : PAGASA

**Disclaimer** : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing altematibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibling contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR LAKE SEBU (SOUTH COTABATO)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	22.58	1.30	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	22.22	1.05	Cloudy	Moderate Rains	60-180			
Fri	19-Jan-24	22.59	1.28	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	20-Jan-24	23.04	1.43	Cloudy	Light Rains	<60	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	23.79	1.03	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	22-Jan-24	24.59	6.29	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	24.85	1.29	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	24.56	1.30	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Thu	25-Jan-24	24.12	1.31	Mostly Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	24.51	1.34	Cloudy	No Rain	0			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR ESPERANZA (SULTAN KUDARAT)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	25.21	1.48	Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.35	1.42	Mostly Cloudy	Heavy Rains	>22.5			
Fri	19-Jan-24	25.09	1.22	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	20-Jan-24	24.81	0.96	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	25.95	0.85	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	22-Jan-24	25.37	5.32	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	24.96	0.82	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	25.19	0.73	Cloudy	No Rain	0			
Thu	25-Jan-24	24.49	1.07	Mostly Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	26-Jan-24	25.13	1.20	Cloudy	No Rain	0			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA  
Disclaimer : DA RFO 5 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Cloudy with No to Light Rains.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses Cloudy with No to Light Rains.

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024





## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR COLUMBIO (SULTAN KUDARAT)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSAS	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	24.65	1.20	Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.00	1.07	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	24.60	0.87	Cloudy	No Rain	0			
Sat	20-Jan-24	24.93	1.21	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	25.26	1.03	Cloudy	No Rain	0			
Mon	22-Jan-24	24.28	4.11	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	23.87	1.67	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	24.56	1.64	Cloudy	No Rain	0			
Thu	25-Jan-24	23.80	1.53	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	26-Jan-24	23.90	1.39	Cloudy	Light Rains	<60			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

New Moon	1/11/2024
First Quarter	1/18/2024
Full Moon	1/25/2024
Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Antipas (North Cotabato)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETSAS	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	25.86	2.07	Mostly Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	24.53	1.82	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	19-Jan-24	25.38	0.64	Cloudy	No Rain	0			
Sat	20-Jan-24	25.96	1.55	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	26.50	1.77	Cloudy	No Rain	0			
Mon	22-Jan-24	26.46	4.47	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	26.19	1.48	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	24-Jan-24	26.22	1.64	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Thu	25-Jan-24	25.56	1.78	Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	26.03	1.05	Cloudy	Light Rains	<60			

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA  
**Disclaimer:** DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

**General Outlook:** Cloudy with No to Light Rains.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds, and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon  
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024



## 10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Tulunan (North Cotabato)

Valid : Jan 17-26, 2024

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	17-Jan-24	26.61	0.89	Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Thu	18-Jan-24	25.56	1.02	Cloudy	Moderate Rains	60-180			
Fri	19-Jan-24	25.78	0.91	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	20-Jan-24	26.12	1.18	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative Reproductive	Fertilizer Application Weeding Spraying
Sun	21-Jan-24	27.00	1.17	Cloudy	No Rain	0			
Mon	22-Jan-24	25.98	4.12	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Maturing	Harvesting, Drying Processing, Marketing
Tue	23-Jan-24	25.42	1.40	Cloudy	No Rain	0			
Wed	24-Jan-24	25.67	1.46	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Thu	25-Jan-24	25.14	1.45	Cloudy	No Rain	0			
Fri	26-Jan-24	25.51	0.96	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing

\*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m<sup>2</sup> na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

### IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Cloudy with No to Light Rains.

### CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

#### RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay

- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

#### VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

#### LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

#### RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Lack of rainfall may result to high irrigation cost
- Drought may hamper tillering and pollination

#### VEGETABLES

- High temperature during the summer months may lead to undeveloped fruits
- Days with zero rainfall may cause stunted growth

#### POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Scarcity of weeds and grasses
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;
- Prone to respiratory diseases (chicks/newly hatched) & parasitism (roundworms)
- Diarrhea

#### LIVESTOCK

- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

### DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA  
 MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon  
 Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono  
 Pagbahagi ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka  
 Climate Information Services

### MOON PHASES

	New Moon	1/11/2024
	First Quarter	1/18/2024
	Full Moon	1/25/2024
	Last Quarter	1/4/2024

Heads Up Ka-AMIA! Check on the updated 10-day Farm Weather Outlook Advisory of AMIA Villages  
(January 17-26, 2024)

- Pigcawayan, North Cotabato
- Tulunán, North Cotabato
- Pres. Roxas, North Cotabato
- Antipas, North Cotabato
- Esperanza, Sultan Kudarat
- Columbio, Sultan Kudarat
- Lake Sebu, South Cotabato
- Tampakan, South Cotabato
- St. Nino, South Cotabato
- Malapatan, Sarangani
- Maasim, Sarangani