



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Tulunan (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 27.22 | 0.68 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 26.04 | 0.95 | Mostly Cloudy | Moderate Rains | 60-180 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.86 | 0.75 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 25.00 | 1.34 | Partly Cloudy | No Rain | 0 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.86 | 1.14 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.59 | 3.48 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.40 | 1.11 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 23.92 | 1.32 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.65 | 1.30 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.82 | 1.16 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, Ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

President Roxas (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.88 | 0.58 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.96 | 0.63 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.25 | 1.15 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 24.64 | 1.18 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.37 | 1.35 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.81 | 3.38 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.83 | 2.48 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.20 | 1.81 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.66 | 2.17 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 24.00 | 1.70 | Cloudy | Light Rains | <60 | 0 | 0 | 0 |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatag ang mga may alagang baboy sa posibling contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Pigkawayan (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 26.60 | 0.61 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.58 | 0.59 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.44 | 1.94 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 25.14 | 1.72 | Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 23.07 | 2.04 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.13 | 3.28 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.35 | 2.34 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.14 | 3.10 | Cloudy | Moderate Rains | 60-180 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.22 | 3.56 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.45 | 2.42 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatay ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

General Outlook: Sunny with Light Rains.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Antipas (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETSAS | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.97 | 0.58 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 26.00 | 0.59 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.29 | 1.09 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 24.72 | 1.14 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.29 | 1.29 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.56 | 3.37 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.80 | 2.39 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.03 | 1.74 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.44 | 2.16 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.77 | 1.68 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 11 na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 Lt big-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC

- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay

- Mainam din paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagpapalagan ng mga peste sa mga alagang hayop, baka, kambing, karnero, baka, kalabaw, kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBBSA

MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon

Pagbigay ng libheng binhi o punla at abono

Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan

Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon 02-Oct-24

First Quarter 10-Oct-24

Full Moon 17/10/2024

Last Quarter 24/10/2024



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR COLUMBIO (SULTAN KUDARAT)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.52 | 0.70 | Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 24.85 | 1.08 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 24.83 | 0.77 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 24.37 | 1.26 | Mostly Cloudy | No Rain | 0 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 21.87 | 1.14 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 22.98 | 3.39 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 22.92 | 1.01 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 23.40 | 1.49 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.26 | 1.39 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.12 | 1.04 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of Basic Information: PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
 - Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
 - Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.
- #### LIVESTOCK and POULTRY
- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
 - Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
 - Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
 - Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
 - Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
 - Mapamatag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
 - Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapag enroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | | |
|--|---------------|------------|
| | New Moon | 02-Oct-24 |
| | First Quarter | 10-Oct-24 |
| | Full Moon | 17/10/2024 |
| | Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR LAKE SEBU (SOUTH COTABATO)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 23.63 | 1.01 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 23.10 | 0.75 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 22.41 | 1.26 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 22.09 | 1.38 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 21.06 | 1.35 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.88 | 3.39 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 24.14 | 3.23 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.82 | 3.49 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.84 | 3.09 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.88 | 2.61 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulanang magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR ESPERANZA (SULTAN KUDARAT)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.86 | 0.57 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.21 | 0.98 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 24.61 | 1.42 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 23.73 | 0.92 | Mostly Cloudy | No Rain | 0 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 21.91 | 1.23 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.62 | 3.32 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.59 | 1.81 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.22 | 2.89 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.50 | 2.74 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.79 | 2.09 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghahina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Maasim (Sarangani)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.42 | 1.65 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.26 | 1.76 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 23.91 | 3.55 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 24.77 | 2.63 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 23.44 | 4.63 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.99 | 3.18 | Sunny | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 24.02 | 4.17 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.72 | 4.10 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.56 | 4.06 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 24.02 | 3.28 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Sigurduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, sigurduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Sigurduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaron ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Sigurduhing makapagenroll sa RSBSA

MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon

Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono

Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan

Climate Information Services

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR MALAPATAN (SARANGANI)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 24.40 | 1.00 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 24.37 | 0.89 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 23.51 | 1.94 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 23.86 | 1.49 | Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.87 | 2.88 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 21.96 | 3.01 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 22.44 | 3.82 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 22.96 | 4.15 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 22.71 | 3.38 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 22.23 | 2.14 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghahina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR SANTO NINO (SOUTH COTABATO)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETSAs | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.67 | 0.73 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.15 | 0.60 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 24.98 | 0.93 | Mostly Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 23.73 | 0.55 | Mostly Cloudy | No Rain | 0 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.32 | 0.89 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 22.42 | 3.32 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 22.18 | 1.68 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 22.93 | 2.82 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 23.53 | 2.33 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 22.74 | 1.84 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information: PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay

- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parastiko.

- Mapamatag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Tulunan (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 27.22 | 0.68 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 26.04 | 0.95 | Mostly Cloudy | Moderate Rains | 60-180 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.86 | 0.75 | Cloudy | No Rain | 0 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 25.00 | 1.34 | Partly Cloudy | No Rain | 0 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.86 | 1.14 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.59 | 3.48 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.40 | 1.11 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 23.92 | 1.32 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.65 | 1.30 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.82 | 1.16 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, Ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghahina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

President Roxas (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 25.88 | 0.58 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.96 | 0.63 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.25 | 1.15 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 24.64 | 1.18 | Mostly Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 22.37 | 1.35 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.81 | 3.38 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.83 | 2.48 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.20 | 1.81 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.66 | 2.17 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 24.00 | 1.70 | Cloudy | Light Rains | <60 | 0 | 0 | 0 |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatag ang mga may alagang baboy sa posibling contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Pigkawayan (North Cotabato)

Valid : Oct 18 - 27, 2024

| ARAW | PETA | Temp. (Ave.) °C | Wind Speed (mps) | Cloud Cover | PAG-ULAN | | COMMODITIES | | |
|------|-----------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------|-------------|--|---|
| | | | | | Forecast | mm/day | CROP | STAGE | FARM OPERATIONS |
| Fri | 18-Oct-24 | 26.60 | 0.61 | Partly Cloudy | Light Rains | <60 | Rice | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application |
| Sat | 19-Oct-24 | 25.58 | 0.59 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Sun | 20-Oct-24 | 25.44 | 1.94 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Mon | 21-Oct-24 | 25.14 | 1.72 | Cloudy | Light Rains | <60 | Corn | (Land Preparation) | Ploughing Harrowing Fertilizer Application |
| Tue | 22-Oct-24 | 23.07 | 2.04 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |
| Wed | 23-Oct-24 | 23.13 | 3.28 | Cloudy | Light Rains | <60 | Vegetables | Reproductive | Fertilizer Application Spraying Irrigating |
| Thu | 24-Oct-24 | 23.35 | 2.34 | Cloudy | Light Rains | <60 | Poultry | Chicks, Grower, Layer | Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing |
| Fri | 25-Oct-24 | 24.14 | 3.10 | Cloudy | Moderate Rains | 60-180 | | | |
| Sat | 26-Oct-24 | 24.22 | 3.56 | Cloudy | Light Rains | <60 | Livestock | Calves/yearling Growing stage Breeding stage | Feeding, Processing Marketing |
| Sun | 27-Oct-24 | 23.45 | 2.42 | Cloudy | Light Rains | <60 | | | |

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

General Outlook: Sunny with Light Rains.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
 - Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
 - Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.
- #### LIVESTOCK and POULTRY
- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
 - Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
 - Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
 - Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
 - Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
 - Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
 - Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Light rains or zero rainfall is conducive for flowering stage
- Excessive rain may reduce pollination and increases white heads
- Flood occurrence may delay crop establishment in lowland and flood prone areas
- Excessive moisture may result to poor germination
- Excessive rain and wind may topple plants

VEGETABLES

- Moderate to heavy rainfall is favorable for flowering and fruiting
- Excessive rainfall may induce damping off and other pests and diseases
- Risk of flooding in lowland areas

POULTRY

- Chicks are susceptible to cold weather resulting to high mortality
- Low egg production; high mortality, low hatchability due to heavy rains;

LIVESTOCK

- Rain helps in abundance of locally grown feedstuffs (cassava, camote, etc)
- Moderate to heavy rains helps in the producing abundant pasture grasses

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

| | |
|---------------|------------|
| New Moon | 02-Oct-24 |
| First Quarter | 10-Oct-24 |
| Full Moon | 17/10/2024 |
| Last Quarter | 24/10/2024 |

Ka-AMIA!! Maging laging hanDA 😊, check the updated 10-day Farm Weather Outlook Advisory (October. 18 - Oct. 27, 2024).

[#ClimateResilient](#) [#AgriTayoSoccsksargen](#) [#AMIASOX](#)