



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

SANTO NINO (SOUTH COTABATO)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETSAT	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	25.01	0.86	Cloudy	Light Rains	0	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	25.47	0.46	Mostly Cloudy	Light Rains	0			
Fri	08-Nov-24	25.55	0.37	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	09-Nov-24	25.73	0.30	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	26.17	0.64	Mostly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	23.48	5.75	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	23.92	0.99	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	23.98	0.92	Mostly Cloudy	No Rain	0			
Thu	14-Nov-24	23.78	0.72	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	23.16	0.75	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katula d ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtanim sa mga mabababang lugar at maddaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

President Roxas (North Cotabato)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	26.23	0.77	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	25.48	0.76	Cloudy	Light Rains	0			
Fri	08-Nov-24	25.71	1.07	Cloudy	Light Rains	0			
Sat	09-Nov-24	25.84	0.86	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	26.02	0.63	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	26.22	4.79	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	26.22	0.44	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	26.03	0.43	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	14-Nov-24	25.83	0.59	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	25.83	0.75	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
 - Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
 - Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
 - Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim
- ##### VEGETABLES
- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
 - Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
 - Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.
- ##### LIVESTOCK and POULTRY
- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
 - Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
 - Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
 - Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
 - Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
 - Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
 - Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBASA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

	New Moon	01-Nov-24
	First Quarter	09-Nov-24
	Full Moon	15-Nov-24
	Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Pigkawayan (North Cotabato)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETSAT	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	26.35	1.00	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	26.07	0.80	Mostly Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	08-Nov-24	25.74	0.78	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	09-Nov-24	25.70	0.72	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	25.43	0.70	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	24.49	5.40	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	25.08	1.05	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	25.41	1.05	Mostly Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	14-Nov-24	24.96	0.91	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	24.69	1.02	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DARFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyong ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganiib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR MALAPATAN (SARANGANI)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETSATA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	24.68	1.41	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	24.05	1.07	Cloudy	Light Rains	0			
Fri	08-Nov-24	24.67	1.41	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	09-Nov-24	24.13	1.56	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	24.17	0.71	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	23.27	4.21	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	23.52	0.76	Mostly Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	23.23	1.05	Cloudy	No Rain	0			
Thu	14-Nov-24	22.97	1.00	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	22.79	0.54	Partly Cloudy	No Rain	0			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Maasim (Sarangani)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETSAT	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	25.51	1.30	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	25.07	1.18	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	08-Nov-24	25.64	1.40	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	09-Nov-24	25.16	1.55	Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	25.05	1.58	Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	24.79	5.06	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	24.93	1.28	Mostly Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	24.84	1.14	Mostly Cloudy	No Rain	0			
Thu	14-Nov-24	24.86	1.30	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	24.47	1.04	Cloudy	No Rain	0			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality state d.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay

- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pagbahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisuw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakang ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

LAKE SEBU (SOUTH COTABATO)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	23.02	1.02	Cloudy	Light Rains	0	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	22.82	0.88	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	08-Nov-24	23.39	0.81	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	09-Nov-24	23.11	1.14	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	23.46	1.10	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	24.91	5.72	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	25.00	1.36	Partly Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	24.93	1.34	Mostly Cloudy	No Rain	0			
Thu	14-Nov-24	24.90	1.17	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	24.55	1.06	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DARFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulanang magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at panumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR ESPERANZA (SULTAN KUDARAT)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	25.31	1.05	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	25.23	0.82	Cloudy	Light Rains	<60			
Fri	08-Nov-24	25.74	0.46	Cloudy	Light Rains	<60			
Sat	09-Nov-24	25.71	0.73	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	25.49	0.66	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	24.69	5.72	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	25.30	1.04	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	25.35	0.94	Partly Cloudy	No Rain	0			
Thu	14-Nov-24	25.29	0.65	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	24.69	0.81	Cloudy	Light Rains	<60	0	0	0

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napumang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

	New Moon	01-Nov-24
	First Quarter	09-Nov-24
	Full Moon	15-Nov-24
	Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR COLUMBIO (SULTAN KUDARAT)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	25.17	1.13	Cloudy	Light Rains	0	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	24.88	0.94	Cloudy	Light Rains	0			
Fri	08-Nov-24	25.35	1.06	Cloudy	Light Rains	0			
Sat	09-Nov-24	25.35	0.94	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	25.41	0.64	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	24.29	5.00	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	25.03	0.62	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	25.02	0.43	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	14-Nov-24	24.33	0.89	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	24.02	0.60	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
 Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
 MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
 Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
 Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
 Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR Antipas (North Cotabato)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	26.21	0.70	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	25.63	0.70	Cloudy	Light Rains	0			
Fri	08-Nov-24	25.77	1.14	Cloudy	Light Rains	0			
Sat	09-Nov-24	25.83	0.91	Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	26.02	0.59	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	26.20	4.89	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	26.14	0.45	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	25.94	0.43	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	14-Nov-24	25.85	0.57	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	25.82	0.72	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1 L na ulan sa buntas sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of their information: PAGASA
Disclaimer: DARFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam din paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taninam.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pinang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pababay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinahikayat ang mga may-ari na ipalinsure sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, igaling magpurga kapag lagay umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatay ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF, Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may nagunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantatag sa katawan, paghahina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang paglala o paghili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kasenting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulalak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtanim sa mga mababang lugar at madaling babain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulalak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Pangantib ng pagbaha sa mababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiv ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayshang mangitlog dahil sa malakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkokunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapag-enroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

Tulanun (North Cotabato)

Valid : November 06 - 15, 2024

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Wed	06-Nov-24	27.11	0.85	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Seedbed preparation Molluscicide Application Fertilizer Application
Thu	07-Nov-24	26.19	0.96	Cloudy	Light Rains	0			
Fri	08-Nov-24	26.76	1.10	Cloudy	Light Rains	0			
Sat	09-Nov-24	26.94	0.82	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Corn	(Land Preparation)	Ploughing Harrowing Fertilizer Application
Sun	10-Nov-24	26.59	0.49	Partly Cloudy	Light Rains	<60			
Mon	11-Nov-24	25.38	5.04	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Tue	12-Nov-24	26.15	0.41	Partly Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Wed	13-Nov-24	26.06	0.21	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	14-Nov-24	25.68	0.71	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Fri	15-Nov-24	25.24	0.78	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm sa ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumubuo sa 1 m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer: DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim malnam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsunite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyong ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakin ng mga karneng baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napanang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghahina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mahabang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganiib ng pagbaha sa mahabang lugar

POULTRY

- Ang mga sintw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapag-enroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	01-Nov-24
First Quarter	09-Nov-24
Full Moon	15-Nov-24
Last Quarter	23-Nov-24

Mag-ingat mga Ka-AMIA, para ani'y tiyak na sagana 😊😊, check the updated 10-day Farm Weather Outlook Advisory (November 06 - November 15, 2024).