



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR COLUMBIO (SULTAN KUDARAT)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	24.51	0.82	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application Weeding Spraying
Tue	28-Jan-25	23.30	1.44	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	
Wed	29-Jan-25	24.36	1.27	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	30-Jan-25	24.57	1.52	Cloudy	Light Rains	<60	Corn	Vegetative	Fertilizer Application Weeding Spraying
Fri	31-Jan-25	25.04	1.39	Mostly Cloudy	No Rain	0		Reproductive	
Sat	01-Feb-25	25.08	8.04	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Sun	02-Feb-25	25.20	1.50	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Mon	03-Feb-25	24.50	1.14	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	24.98	1.18	Mostly Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Wed	05-Feb-25	24.16	1.37	Cloudy	Light Rains	<60			
							0	0	0

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pagpinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay

- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pagpinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pagproseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahaya para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakin ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak

- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads

- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtanim sa mga mababang lugar at madaling bahain

- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon

- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

- VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga

- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit

- Panganib ng pagbaha sa mababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay

- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR ESPERANZA (SULTAN KUDARAT)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	25.51	0.70	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application Weeding
Tue	28-Jan-25	23.81	1.05	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Spraying
Wed	29-Jan-25	25.01	1.05	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	30-Jan-25	24.92	1.25	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application Weeding
Fri	31-Jan-25	25.48	0.71	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Spraying
Sat	01-Feb-25	25.24	7.83	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Sun	02-Feb-25	25.72	0.63	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Mon	03-Feb-25	25.78	0.69	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	25.61	0.90	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Wed	05-Feb-25	25.36	0.88	Cloudy	No Rain	0	0	0	0

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. *Source of basic information* : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
 - Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
 - Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
 - Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim
- ##### VEGETABLES
- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
 - Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
 - Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.
- ##### LIVESTOCK and POULTRY
- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
 - Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
 - Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit
 - Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
 - Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
 - Mapamatay ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
 - Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
 MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
 Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
 Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
 Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

LAKE SEBU (SOUTH COTABATO)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETSAs	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	22.70	0.84	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application
Tue	28-Jan-25	22.66	1.50	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Wed	29-Jan-25	22.90	1.51	Cloudy	Light Rains	<60			Spraying
Thu	30-Jan-25	22.85	1.77	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application
Fri	31-Jan-25	23.62	1.60	Mostly Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Sat	01-Feb-25	24.89	9.57	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application
Sun	02-Feb-25	24.65	1.27	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding
Mon	03-Feb-25	24.54	1.31	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	24.61	1.14	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage	Feeding, Processing
Wed	05-Feb-25	24.45	1.12	Cloudy	Light Rains	<60			
							0	0	0

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplementi para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng babahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR Maasim (Sarangani)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	24.91	0.96	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application
Tue	28-Jan-25	24.84	3.57	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Wed	29-Jan-25	25.59	3.44	Cloudy	Moderate Rains	60-180			Spraying
Thu	30-Jan-25	25.51	3.68	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application
Fri	31-Jan-25	25.83	2.88	Partly Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Sat	01-Feb-25	25.22	10.92	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application
Sun	02-Feb-25	24.53	1.90	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding
Mon	03-Feb-25	24.76	1.26	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	24.66	1.24	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage	Feeding, Processing
Wed	05-Feb-25	24.40	1.16	Cloudy	Light Rains	<60			
							0	0	0

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA

Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC

- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay

- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala

- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libheng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

IMPACT OUTLOOKS

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR MALAPATAN (SARANGANI)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETS	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	24.54	0.98	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application
Tue	28-Jan-25	23.48	2.59	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Wed	29-Jan-25	24.61	2.60	Cloudy	Light Rains	<60			Spraying
Thu	30-Jan-25	24.89	2.99	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application
Fri	31-Jan-25	25.07	2.26	Mostly Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Sat	01-Feb-25	23.60	11.37	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application
Sun	02-Feb-25	22.97	1.74	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding
Mon	03-Feb-25	22.96	1.30	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	23.43	1.24	Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage	Feeding, Processing
Wed	05-Feb-25	23.13	1.05	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Sigurduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Bago maglagay ng abono, sigurduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Sigurduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.

- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay

- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan

- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina

- Maglaan ng pabahaya para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.

- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.

- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.

- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.

- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Pangambig ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Sigurduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR Pigkawayan (North Cotabato)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	26.17	0.95	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application
Tue	28-Jan-25	25.90	1.57	Mostly Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Wed	29-Jan-25	26.05	1.81	Cloudy	Light Rains	<60			Spraying
Thu	30-Jan-25	25.89	2.70	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application
Fri	31-Jan-25	26.41	1.76	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding
Sat	01-Feb-25	25.84	7.65	Cloudy	Light Rains	<60	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application
Sun	02-Feb-25	25.61	1.65	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Spraying
Mon	03-Feb-25	25.61	1.14	Cloudy	Light Rains	<60			Irrigating
Tue	04-Feb-25	25.61	1.47	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Brooding, Feeding
Wed	05-Feb-25	25.58	1.10	Cloudy	No Rain	0			Laying, Processing, Marketing
							0	0	0

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taniman para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatuulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatuulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

President Roxas (North Cotabato)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETSATSA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	24.81	1.06	Mostly Cloudy	No Rain	0	Rice	Vegetative	Fertilizer Application
Tue	28-Jan-25	24.85	1.65	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding Spraying
Wed	29-Jan-25	25.07	1.70	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	30-Jan-25	25.65	1.15	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application
Fri	31-Jan-25	25.37	1.63	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding Spraying
Sat	01-Feb-25	26.70	8.13	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Sun	02-Feb-25	26.43	1.54	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Mon	03-Feb-25	26.45	1.09	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	26.77	1.23	Mostly Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Wed	05-Feb-25	26.26	1.33	Cloudy	No Rain	0			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1 L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok.

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyag ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabagal sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganiib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyung asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR

SANTO NINO (SOUTH COTABATO)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	24.97	0.28	Mostly Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application Weeding Spraying
Tue	28-Jan-25	23.84	0.42	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	
Wed	29-Jan-25	25.10	0.50	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	30-Jan-25	24.84	1.03	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application Weeding Spraying
Fri	31-Jan-25	26.16	0.43	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	
Sat	01-Feb-25	23.82	8.37	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Sun	02-Feb-25	24.08	0.71	Cloudy	No Rain	0	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Mon	03-Feb-25	23.60	1.00	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	23.83	0.83	Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Wed	05-Feb-25	23.20	0.84	Cloudy	Light Rains	<60			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
- Panatiliing malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
- Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok

LIVESTOCK and POULTRY

- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
- Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
- Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
- Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
- Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
- Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
- Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagreresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25



10-DAY FARM WEATHER OUTLOOK AND ADVISORY FOR Tulunan (North Cotabato)

Valid : Jan 27 - Feb 5, 2025

ARAW	PETA	Temp. (Ave.) °C	Wind Speed (mps)	Cloud Cover	PAG-ULAN		COMMODITIES		
					Forecast	mm/day	CROP	STAGE	FARM OPERATIONS
Mon	27-Jan-25	26.35	0.61	Cloudy	Light Rains	<60	Rice	Vegetative	Fertilizer Application
Tue	28-Jan-25	24.61	1.35	Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding Spraying
Wed	29-Jan-25	25.85	1.10	Cloudy	Light Rains	<60			
Thu	30-Jan-25	25.72	1.18	Cloudy	No Rain	0	Corn	Vegetative	Fertilizer Application
Fri	31-Jan-25	26.08	1.38	Mostly Cloudy	No Rain	0		Reproductive	Weeding Spraying
Sat	01-Feb-25	26.01	7.86	Cloudy	No Rain	0	Vegetables	Reproductive	Fertilizer Application Spraying Irrigating
Sun	02-Feb-25	26.28	1.37	Cloudy	Light Rains	<60	Poultry	Chicks, Grower, Layer	Brooding, Feeding Laying, Processing, Marketing
Mon	03-Feb-25	26.12	0.86	Cloudy	Light Rains	<60			
Tue	04-Feb-25	26.16	0.94	Mostly Cloudy	No Rain	0	Livestock	Calves/yearling Growing stage Breeding stage	Feeding, Processing Marketing
Wed	05-Feb-25	25.80	0.99	Cloudy	No Rain	0			

*Ang 1 mm na ulan ay katumbas ng 1L na ulan na bumuhos sa 1-m² na lupa. Kung sa isang hektarya, ito ay katumbas ng 10,000 L tubig-ulan. Source of basic information : PAGASA
Disclaimer : DA RFO 12 is not liable to any loss or damages arising from utilizing the Farm Weather Outlook and Advisory. The forecast is valid only to the dates and municipality stated.

IMPACT OUTLOOKS

CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE PRACTICES

RICE and CORN

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at kapag may nakitang pinsala sa pananim mainam na ipagbigay alam sa Agricultural Technologist na nakabase sa inyong lugar upang makapagsumite ng Claim for Indemnity sa PCIC
- Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
- Bago maglagay ng abono, siguraduhing malinis ang mga maisan para maiwasan ang kompetisyon ng mais at damo. Maglagay ng rekomendaryong abono na may layong 4-6cm sa puno ng mais sa edad na 25-30 days
- Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning mais at palay
- Mainam ang paggamit ng bagong teknolohiya katulad ng PALAY CHECK at INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) sa pamamahala ng pananim

VEGETABLES

- Siguraduhing nakapaginsured sa PCIC ang bagong pananim at mag apply ng Claim for Indemnity kung may nakitang pinsala
 - Panatilihin malinis ang ating taninam para maiwasan ang pag pinsala at pananatili ng mga pesting daga sa taniman.
 - Maghanda ng imbakan kung sakaling hindi agad mabenta ang inaning gulay
 - Mainam din gawing alternatibo ang pag proseso nito para maiwasan ang pagka bulok
- ##### LIVESTOCK and POULTRY
- Magbigay ng bitamina at mineral bilang suplemento para maiwasan ang pagkaroon ng sakit dahil sa pagulan
 - Maghanda ng brooder para sa bagong pisang itlog at ilaw upang di ginawin at manghina
 - Maglaan ng pabahay para sa alagang hayop para hindi maulan at magkasakit.
 - Hinihikayat ang mga may-ari na ipainsured sa PCIC ang mga alagang hayop.
 - Para sa may mga alagang Kambing, Karnero, Baka, Kalabaw at Kabayo, ugaling magpurga kapag laging umuulan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulati at iba pang parasitiko.
 - Mapamatyang ang mga may alagang baboy sa posibleng contamination ng ASF. Iwasan din ang pagpapakain ng mga karning baboy o swill feeding sa mga ito. Kapag may napunang sintomas sa mga alaga tulad ng lagnat, pantal2 sa katawan, paghihina at biglaang pagkamatay, ireport agad sa Office of the Municipal Agriculturist.
 - Iwasan ang pagdala o pagbili ng mga processed products na galing sa lugar na may ASF.

RICE and CORN

- Ang kaunting pag-ulan o walang pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak
- Ang labis na ulan ay maaaring magpababa ng pollination at magpataas ng white heads
- Ang pagbaha ay maaaring magpabalag sa pagtatanim sa mga mabababang lugar at madaling bahain
- Ang labis na moisture ay maaaring magdulot ng hindi magandang germinasyon
- Ang labis na ulan at hangin ay maaaring magpatumba ng mga pananim

VEGETABLES

- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakabubuti para sa pamumulaklak at pamumunga
- Ang labis na pag-ulan ay maaaring magdulot ng damping off at iba pang peste at sakit
- Panganib ng pagbaha sa mabababang lugar

POULTRY

- Ang mga sisiw ay sensitibo sa malamig na panahon, na nagresulta sa mataas na dami ng namamatay
- Mababa ang produksyon ng itlog; mataas ang mortalidad, mababang kakayahang mangitlog dahil sa malalakas na ulan

LIVESTOCK

- Ang ulan ay nakakatulong sa kasaganaan ng mga lokal na pinagkukunan ng pagkain (cassava, camote, atbp.)
- Ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ay nakakatulong sa pagpapalago ng mga damo

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUPPORTS

Siguraduhing makapagenroll sa RSBSA
MagpaCSO Accredited sa DA RFO XII para sa inyong asosasyon
Pagbigay ng libreng binhi o punla at abono
Pamamahagi ng Veterinary Drugs and Biologics para sa mga kahayupan
Climate Information Services

MOON PHASES

New Moon	06-Jan-25
First Quarter	13-Jan-24
Full Moon	21-Jan-25
Last Quarter	29-Jan-25

"Kaalaman sa panahon, proteksyon sa ating pananim!", Ka-AMIA check the updated 10-day Farm Weather Outlook Advisory (January 27 - February 5, 2025). 😊😊

[#ClimateResilient](#) [#AgriTayoSoccsksargen](#) [#AMIASOX](#)